NOTFALL-triage

Bewusstlosigkeit

Problem:
Kind reagiert nicht mehr / ist bewusstlos

Hören oder sehen Sie eine regelmässige Atmung?

Fühlen Sie einen regelmässigen Puls (Hals/Leiste/Arm)?

Ja
1. Legen Sie das Kind in Seitenlage.
2. Bleiben Sie bei ihm.
3. Stimulieren Sie es mit Zureden, streicheln; NICHT schütteln.

Kind wird nach 5-10 min wieder wach und reagiert situationsadäquat.

Kind wird nach nach 5-10 min nicht wach.

Nein
1. Legen Sie das Kind auf den Rücken.
2. Reanimation starten: ➔ Mund-zu-Nasen-Beatmung: 10-12x/min
3. Bei auftretendem Puls aber weiter fehlender Spontanatmung ➔ weiter beatmen 10-12x/min
4. Bei fehlendem Puls ➔ Herzmassage einleiten mit einer Frequenz von 100/min ➔ Verhältnis Massage:Beatmung = 15:2
5. Reanimation stoppen, wenn Kind wieder atmet und einen regelmässigen Puls hat...
6. ...sonst Reanimation fortführen bis Ambulanz eintrifft.

041 760 04 14
oder
0900 008 008

144
Name, Alter des Kindes, Adresse, Problem

©PRAXIS KUNTERBUNT