

NOTFALL-triage

Erbrechen / Durchfall

Problem:
Kind erbricht Nahrung und Getränke sofort nach der Einnahme und/oder hat mehrmals flüssigen Stuhlgang.

Hat das Kind Fieber?

Wie alt ist Ihr Kind?

T < 38.5°C

Alter > 1 Jahr

T > 38.5°C

Alter < 1 Jahr

- 1. Geben Sie dem Kind nur löffelweise kühle Getränke: Rehydrierungslösung (Normolytoral oder GES 45), gezuckerten Tee, Cola, Wasser.
- 2. Reduzieren Sie für 1-2 Tage die Milchmenge.
- 3. Bieten Sie dem Kind Salzstangen und Zwieback an.

- 1. Verabreichen Sie ein fiebersenkendes Medikament.
- 2. Falls gestillt: setzen Sie das Kind häufiger an, lassen es jeweils nur kurz trinken.
- 3. Geben Sie dem Kind löffelweise kühle Getränke: Rehydrierungslösung (Normolytoral oder GES 45), gezuckerten Tee, Wasser.

Hat Ihr Kind noch genug Flüssigkeit?

- Kind hat:
- 1. eine feuchte Zunge/Mund und beim Weinen Tränen
 - 2. mind. alle 12 Std. Urin (feuchte Windeln)
 - 3. einen Puls von 80-120/Min
 - 4. einen guten Allgemeinzustand

- Kind hat:
- 1. eine trockene Zunge mit fadenziehendem Speichel
 - 2. keinen Urin für > 12 Std.
 - 3. einen Puls von < 80 oder > 120/Min
 - 4. einen schlechten Allgemeinzustand: ist apathisch und reagiert kaum mehr auf Aussenreize

- 1. Lassen Sie Ihr Kind weiter regelmässig trinken.
- 2. Bei sehr flüssigem Stuhl verabreichen Sie 2-3 Tage Carbolevure (Kohle).
- 3. Machen Sie einen langsamen Nahrungsaufbau.

041 760 04 14
oder
0900 008 008