

Problem:
Kind hat hohes Fieber und reagiert plötzlich nicht mehr, ist sehr steif oder zuckt ruckartig mit Armen und Beinen.

1. Bewahren Sie Ruhe.
2. Legen Sie das Kind in Seitenlage auf den Boden oder ins Bett (Sturz- oder Erbrechensgefahr).
3. Schauen sie auf die Uhr - wie lange dauert das Ereignis?
4. Öffnen Sie die Kleider des Kindes, kühlen Sie es mit Wasser!
5. Geben Sie dem Kind ein fiebersenkendes Zäpfchen!

Krampfanfall stoppt nach < 5 Min
1. Zuckungen stoppen, Steifigkeit löst sich.
2. Kind öffnet die Augen, ist aber noch schläfrig.

Krampfanfall dauert > 5 Min
1. Zuckungen und/oder Steifigkeit bleiben
2. Kind schaut und spricht nicht
3. Lippen sind bläulich verfärbt
→ siehe Vorgehen „Bewusstlosigkeit“

1. Messen Sie das Fieber nach 20-30 Min!
2. Wie alt ist Ihr Kind?

144

Kind ist > 1 Jahr

1. Fieber sinkt rasch
2. Kind hat wieder guten Allgemeinzustand: trinkt, schwatzt, spielt.

Kind ist < 1 Jahr

Fieber bleibt

1. Verabreichen Sie bis zu einer ärztlichen Kontrolle alle 6-8 Stunden ein fieber-senkendes Medikament!
2. Lassen Sie Ihr Kind innert 1-2 Tagen beim Kinderarzt untersuchen!

041 760 04 14
oder
0900 008 008